

# Caractéristiques des Lômes Post-restauration

Lômes	Effectif total					
	2004	2005	2006	2007	2008	Moyenne
Lôme Malourdie	58	72	401	122	135	<b>158</b>
Lôme Brotalet	500	160	210	262	121	<b>251</b>
Lôme des Luisettes	-	58	156	68	41	<b>81</b>
Lôme Moiroud	-	10	195	32	60	<b>74</b>
Lôme Béard	-	178	13	4	12	<b>52</b>
Lôme Fournier	-	142	69	89	69	<b>92</b>
Anse de Yenne	-	276	176	89	228	<b>192</b>
Lôme de Chantemerle	-	-	192	56	25	<b>91</b>
Lôme des granges	-	-	68	220	5	<b>98</b>
Lôme Vachon	-	-	201	51	6	<b>86</b>
Lôme des cerisiers	-	-	425	248	22	<b>232</b>
Lôme Mattant	-	-	76	145	31	<b>84</b>
Lôme des Molottes	-	-	68	513	411	<b>331</b>
Lôme du Ponton	-	-	201	421	632	<b>418</b>

Pourcentage d'esp. litho-phyto & phytophiles					
2004	2005	2006	2007	2008	Moyenne
0,00	0,03	0,08	0,01	0,10	<b>0,04</b>
0,07	0,26	0,17	0,12	0,31	<b>0,19</b>
-	0,53	0,38	0,5	0,15	<b>0,39</b>
-	0,50	0,34	0,25	0,02	<b>0,28</b>
-	0,07	0,31	0,5	0,00	<b>0,22</b>
-	0,05	0,04	0,2	0,09	<b>0,09</b>
-	0,09	0,2	0,02	0,01	<b>0,08</b>
-	-	0,15	0,25	0,80	<b>0,40</b>
-	-	0,45	0,2	0,20	<b>0,28</b>
-	-	0,19	0,12	0,00	<b>0,10</b>
-	-	0,05	0,21	0,14	<b>0,13</b>
-	-	0,16	0,03	0,03	<b>0,07</b>
-	-	0,54	0,43	0,11	<b>0,36</b>
-	-	0,61	0,24	0,64	<b>0,50</b>

Pourcentage de 0+					
2004	2005	2006	2007	2008	Moyenne
0,86	0,69	0,76	0,71	0,6	<b>0,72</b>
0,66	0,56	0,80	0,90	0,79	<b>0,74</b>
-	0,67	0,47	0,28	0,78	<b>0,55</b>
-	0,30	0,58	0,44	0,72	<b>0,51</b>
-	0,38	0,08	0,00	0,25	<b>0,18</b>
-	0,88	0,94	0,57	0,83	<b>0,81</b>
-	0,92	0,93	0,24	0,41	<b>0,63</b>
-	-	0,86	0,30	0,96	<b>0,71</b>
-	-	0,76	0,49	0,6	<b>0,62</b>
-	-	0,79	0,27	0	<b>0,35</b>
-	-	0,49	0,56	0,5	<b>0,52</b>
-	-	0,48	0,28	0,35	<b>0,37</b>
-	-	0,90	0,88	0,96	<b>0,91</b>
-	-	0,86	0,71	0,99	<b>0,85</b>

Effectifs totaux capturés par pêche, proportion d'espèces phytophiles et litho-phytophiles et proportion de juvéniles de l'année (0+) dans chacune des lômes suivies après restauration. Les valeurs moyennes les plus importantes ont été surlignées.